

Esta hoja le explica cómo preparar dosis de emergencia de

Doxiciclina

para bebés y niños expuestos al **plaga**

Una vez que haya sido notificado por sus autoridades federales, estatales y locales que la población ha sido expuesto a **plaga**, puede ser necesario que tenga que preparar dosis de emergencia de Doxiciclina para infantes y niños usando tabletas de Doxiciclina.

Se necesita:

- Una tableta de (1) 100 miligramos (mg) de doxiciclina
- Una cucharilla de metal
- Cucharas para medir [1 cucharilla; and ½ cucharilla]
(NOTA: Las cucharas de medir son preferibles; no obstante, si no están disponibles, se puede usar la cuchara de metal para moler, medir y administrar la medicina)
- 1 tazón pequeño
- Una de las siguientes comidas o bebidas:
 - almíbar de chocolate
 - almíbar de caramelo
 - puré de manzana

Direcciones:

1. Ponga una (1) tableta de doxiciclina de 100 mg. dentro del tazón. Triture la tableta con el dorso de la cuchara hasta que ya no se vean pedazos grandes.



2. Agregue cuatro (4) cucharillas niveladas de comida a la mezcla de doxiciclina. Revuélvalas hasta que la droga esté bien disuelta.



Cuánta Mezcla de doxiciclina hay que suministrar al niño

El número de cucharillas de la mezcla de doxiciclina suministrada al niño depende del peso del niño. **Si no se conoce el peso del niño, hay que pesarlo antes de suministrar la primera dosis.** La tabla le explica que cantidad debe darle a su niño por dosis. Debe de suministrarle dos dosis diarias (una por la mañana y una por la tarde) por 7 días.

Si el niño pesa	Suministre
4 – 11 libras	Media (2.5 ml) cucharilla de la mezcla de doxiciclina
12 – 22 libras	Una (5 ml) cucharilla de la mezcla de doxiciclina
23 – 33 libras	Una y media (7.5 ml) cucharillas de la mezcla de doxiciclina
34 - 45 libras	Dos (10 ml) cucharillas de la mezcla de doxiciclina
46 - 55 libras	Dos y media (12.5 ml) cucharillas de la mezcla de doxiciclina
56 - 65 libras	Tres (15 ml) cucharillas de la mezcla de doxiciclina
66 - 77 libras	Tres y media (17.5 ml) cucharillas de la mezcla de doxiciclina
78 - 88 libras	Cuatro (20 ml) cucharillas de la mezcla de doxiciclina (o una tableta)
Niños que pesan más de 88 libras que son expuestos al plaga deben tomar una (1) pastilla de 100 mg. de Doxiciclina dos veces diarias (a la misma hora cada día, si es posible) durante 7 días. Si el niño no se puede tragar las pastillas, siga las indicaciones previas para preparar una mezcla y déle 4 cucharillas dos veces cada día.	

Como se debe almacenar la mezcla de doxiciclina

- Prepare la mezcla de Doxiciclina diariamente, guarde la mezcla en un recipiente cubierto y refrigérelo.
- La Doxiciclina mezclada con las comidas recomendadas se mantendrán bien por lo menos 24 horas.
- Descarte las porciones no usadas.

