

Esta hoja explica cómo preparar dosis de

## Co-trimoxazole

Para niños menores de 8 años de edad expuestos a la **Brucelosis**

*Una vez que usted haya sido notificado por las autoridades federales, estatales y locales que usted ha sido expuesto a la **brucelosis**, puede ser necesario que tenga que preparar dosis de emergencia de co-trimoxazole para infantes y niños, usando las tabletas de co-trimoxazole.*

### Usted necesitará:


- Una tableta de (1) 800/160 miligramos (mg) de Co-trimoxazole
- Una cucharilla de metal
- Cucharas para medir [1 cucharilla (tsp); and ½ cucharilla (tsp)]  
(NOTA: las cucharas para medir son preferibles; no obstante, si no están disponibles, se puede usar la cuchara de metal para moler, medir y administrar la medicina)
- 1 tazón pequeño
- Una de las siguientes comidas o bebidas:
  - almíbar de chocolate
  - almíbar de caramelo
  - puré de manzana

### Direcciones:

1. Ponga una (1) tableta de 800/160mg de Co-Trimoxazole, dentro de un tazón. Triture la tableta con el dorso de la cuchara hasta que ya no se vean pedazos grandes.



2. Agregue cinco (5) cucharillas niveladas de comida al Co- Trimoxazole triturado. Revuélvalas hasta que la droga esté bien mezclada con la comida o bebida.



### Cuánta mezcla de Co-Trimoxazole hay que suministrar al niño

La cantidad de cucharillas de la mezcla de Co-Trimoxazole suministrada al niño depende de su peso. **Si no se conoce el peso del niño, hay que pesarlo antes de suministrar la primera dosis.** La tabla le explica cuánto debe de darle al niño por dosis. Debe de suministrarle dos dosis diarias (una por la mañana y una por la tarde).

Si el niño pesa	Suministre
4 - 7 libras	<b>Media (1/2) cucharilla o ( 2.5 ) ml</b> de la mezcla de Co-Trimoxazole
8 - 15 libras	<b>Una (1) cucharilla ( 5 ml )</b> de la mezcla de Co- Trimoxazole
16 - 20 libras	<b>Una cucharilla y media (1 ½) o (7.5 ml)</b> de la mezcla de Co-Trimoxazole
21 - 25 libras	<b>Dos (2) cucharillas (tsp) o (10 ml)</b> de la mezcla de Co-Trimoxazole
26 - 30 libras	<b>Dos cucharillas y media (2 ½) o (12.5)</b> de la mezcla de Co-Trimoxazole
31 - 36 libras	<b>Tres (3) cucharillas (15 ml )</b> de la mezcla de Co-Trimoxazole
37 – 45 libras	<b>Tres cucharillas y media (3 ½) o (17.5ml)</b> mezcla de Co- Trimoxazole
46 - 55 libras	<b>Cuatro (4) cucharillas (20ml)</b> de la mezcla de Co-Trimoxazole
56 – 63 libras	<b>Cuatro cucharillas y media (4 ½) o (22.5 ml)</b> de la mezcla de Co- Trimoxazole
64 - 75 libras	<b>Cinco (5) cucharillas ( 25 ml )</b> de la mezcla de Co- Trimoxazole (o una tableta)
Niños que pesan más de 75 libras y menores de 8 años, que han sido expuestos a la Brucelosis deben tomar una tableta y media (1 ½) de 800/160 mg de Co-Trimoxazole dos veces al día (a la misma hora cada día, si es posible) de 3-6 semanas,	

### Como se debe almacenar la mezcla de Co- Trimoxazole preparada

- El Co- Trimoxazole mezclado con cualquiera de las comidas recomendadas puede mantenerse por lo menos 24 horas.
- Guarde la mezcla en un recipiente cubierto y refrigérelo.
- Prepare la mezcla de Co- Trimoxazole diariamente; porciones no usadas deben de ser desechadas.

**Nota:** Los niños que estén recibiendo Co-Trimoxazole como profiláctico contra la Brucelosis deberán tomar Rifampicina ( Rifampin ) también . Vea las hojas adicionales para instrucciones y dosis.