

Esta hoja explica cómo preparar dosis de emergencia de

Doxiciclina

para niños mayores de 8 años de edad que han sido expuestos a la

Brucelosis

Una vez que usted haya sido notificado por las autoridades federales, estatales y locales que usted ha sido expuesto a la **brucelosis**, puede ser necesario que tenga que preparar dosis de emergencia de Doxiciclina para infantes y niños, usando las tabletas de Doxiciclina.

Usted necesitará:

- Una tableta de (1) 100 miligramos (mg) de doxiciclina
- Una cucharadita de metal
- Cucharas para medir [1 cucharadita (tsp); y ½ cucharilla (tsp)]
(NOTA: las cucharas para medir son preferibles; no obstante, si no están disponibles, se puede usar la cuchara de metal para moler, medir y administrar la medicina)
- 1 tazón pequeño
- Una de las siguientes comidas o bebidas:
 - almíbar de chocolate
 - almíbar de caramelo
 - puré de manzana

Direcciones:

1. Ponga una (1) tableta de Doxiciclina de 100 mg. dentro del tazón. Triture la tableta con el dorso de la cuchara hasta que ya no se vean pedazos grandes.



2. Agregue cuatro(4) cucharaditas niveladas de comida o bebida a la doxiciclina triturada. Revuélvalas hasta que la droga esté bien mezclada.



Cuánta mezcla de Doxiciclina hay que suministrar al niño

La cantidad de cucharaditas de la mezcla de doxiciclina suministrada al niño depende de su peso. **Si no se conoce el peso del niño, hay que pesarlo antes de suministrar la primera dosis.** La tabla le explica que cantidad de doxiciclina le debe dar al niño por dosis. Debe de suministrarle dos dosis diarias cada día (una por la mañana y una por la tarde) .

Si el niño pesa	Suministre
4 – 11 libras	Media (1/2) cucharadita (2.5 ml) de la mezcla de doxiciclina
12 - 22 libras	Una (1) cucharadita (5ml) de la mezcla de doxiciclina
23 - 33 libras	Una cucharadita y media (1 ½) (7.5 ml) de la mezcla de doxiciclina
34 - 45 libras	Dos (2) cucharaditas (tsp) (10 ml) de la mezcla de doxiciclina)
46 - 55 libras	Dos cucharaditas y media (2 ½) (12.5ml) de la mezcla de doxiciclina
56 - 65 libras	Tres (3) cucharaditas (15 ml) de la mezcla de doxiciclina
66 – 77 libras	Tres cucharaditas y media (3 ½) (17.5 ml) de la mezcla de doxiciclina
78 - 88 libras	Cuatro (4) cucharaditas (20 ml) de la mezcla de doxiciclina

Niños que pesen más de 88 libras que han sido expuestos a la brucelosis deben tomar uno (1) tableta de 100 mg. de doxiciclina dos veces al día (a la misma hora, si es posible) de 3 a 6 semanas. Si su niño no puede tragar las tabletas. Use las instrucciones para preparar la mezcla y déle 4 cucharaditas dos veces al día.

Como se debe almacenar la mezcla de doxiciclina preparada

- La Doxiciclina mezclada con cualquiera de las comidas recomendadas puede mantenerse por lo menos 24 horas.
- Guarde la mezcla en un recipiente cubierto y refrigérela.
- Prepare la mezcla de Doxiciclina diariamente.
- Descarte las porciones no usadas.

Nota: Los niños que estén recibiendo Doxiciclina como profiláctico contra la Brucelosis, deberán tomar Rifampicina (Rifampin). Vea las hojas adicionales para instrucciones y dosis.