

Thờ này giải thích cách pha chế các liều lượng của  
**Doxycycline**  
cho các bé thờ và trẻ em bị nguy hiểm về tularemia/bệnh thờ

Một khi bạn đã được thông báo bởi liên bang, tiểu bang, hay chính quyền địa phương rằng bạn đã bị nguy hiểm về tularemia, điều cần thiết là pha chế các liều thuốc **khẩn cấp** từ các viên doxycycline cho bé thờ và trẻ em.

**Bạn sẽ cần:**

- một (1) viên doxycycline 100 milligram (mg)
- muỗng kim loại
- muỗng đo lường (1 muỗng trà; và ½ muỗng trà)  
(GHI CHÚ muỗng đo lường được cung cấp, tuy nhiên nếu không có sẵn, dùng muỗng kim loại để nghiền, đo lường và cho uống thuốc)
- 1 chén nhỏ
- Một trong những thực phẩm này
  - nước ngọt sôcôla
  - nước ngọt maple/cây thích
  - nước ngọt đường trắng/caramel
  - sốt trái táo

**Hướng dẫn:**

1. Để một (1) viên doxycycline 100-mg vào một chén nhỏ. Nghiền nát viên thuốc bằng phần lưng của muỗng kim loại cho đến khi không còn thấy những mảnh lớn.



2. Thêm bốn (4) muỗng trà thực phẩm bằng phẳng vào doxycycline nghiền nát. Khuấy trộn đều cho đến khi thuốc hòa đều với thực phẩm.



## Bao nhiêu Doxycycline Hồn hợp để Cho một Đứa bé

Số lượng muỗng trà của doxycycline hồn hợp để cho một đứa trẻ tùy thuộc vào sức nặng của bé. **Nếu không biết sức nặng của bé, hãy cân bé trước khi cho uống lượng thuốc đầu tiên.** Biểu đồ định bao nhiêu đủ của một lượng thuốc để cho bé. Bạn nên cho bé **hai lượng thuốc** mỗi ngày (một vào buổi sáng và một vào buổi chiều) **đến 14 ngày**

Nều bé cân	Cho bé
4 -11 cân (lbs)	một nửa (1/2) muỗng trà (2.5ml) của Doxycycline hồn hợp
12 – 22 (lbs)	<b>một (1) muỗng trà (5ml) của Doxycycline hồn hợp</b>
23 – 33 (lbs)	một và một nửa (1 ½) muỗng trà (7.5ml) của Doxycycline hồn hợp
34 – 45 (lbs)	<b>hai (2) muỗng trà (10ml) của Doxycycline hồn hợp</b>
46 – 55 (lbs)	hai và một nửa (2 ½) muỗng trà (12.5ml) của doxycycline hồn hợp
56 – 65 (lbs)	<b>ba (3) muỗng trà (15ml) của Doxycycline hồn hợp</b>
66 – 77 (lbs)	ba và một nửa (3 ½) muỗng trà (17.5ml) của Doxycycline hồn hợp
78 -88 (lbs)	<b>bốn (4) muỗng trà (20ml) của Doxycycline hồn hợp (hay 1 viên)</b>

Các trẻ em nặng hơn 88 cân bị nguy hiểm về bệnh thỏ nên uống một (1) viên doxycycline 100-mg hai lần một ngày (cùng giờ mỗi ngày nếu có thể) **đến 14 ngày.** Nếu trẻ không thể nuốt trọn những viên thuốc, hãy dùng cách hướng dẫn pha chế hồn hợp và cho uống 4 muỗng trà mỗi ngày.

### Cách Nền Giữ Hồn hợp Doxycycline Đã Được Pha chế

- Pha chế hồn hợp doxycycline mỗi ngày; giữ trong vật chứa đậy kín để trong tủ lạnh.
- Doxycycline pha trộn với bất cứ các thực phẩm được đề nghị sẽ giữ ít nhất 24 giờ.
- Bỏ đi những phần không dùng.