

Thẻ này giải thích cách pha chế các lượng thuốc khăn cấp của

## Rifampin

Cho các bé nhỏ và trẻ em để bị nguy về **sốt brucellosis**

Một khi bạn đã được thông báo bởi liên bang, tiểu bang, hay chính quyền địa phương của bạn rằng bạn đã bị nguy về sốt brucellosis. Có thể cần pha chế các liều lượng thuốc khăn cấp cho các bé nhỏ và trẻ em dùng từ các viên nhộng Rifampin.

### Bạn sẽ cần:

- Hai (2) viên nhộng rifampin 300 milligram (mg)
- Muỗng trà kim loại
- Các muỗng đo lường [1 muỗng trà; và ½ muỗng trà] (**GHI CHÚ** các muỗng đo lường được cấp, tùy nhiên nếu không có sẵn, dùng muỗng kim loại để nghiên, đo lường, và cho uống thuốc)
- 1 chén nhỏ
- Một cửa nhúng thức ăn này
  - xi rô sôcôla
  - xi rô maple/cây thích
  - xi rô caramel/dường trắng
  - sốt trái táo

### Hướng dẫn:

1. Mở hai (2) bao nhộng rifampin 300 mg vào trong chén nhỏ. Để phần chứa trong các bao nhộng vào chén nhỏ và bỏ bao nhộng rỗng. Nghiên phần chứa bằng phần lưng của muỗng kim loại cho đến khi không thấy những mảnh lớn.



2. Thêm sáu (6) muỗng trà thức ăn phẳng vào rifampin được nghiên. Khuấy đều cho đến khi thuốc hòa tan với thức ăn.



### Bao nhiêu Rifampin Hồn hợp để cho một Em bé

Số lượng muỗng trà của rifampin hồn hợp để cho một em bé tùy thuộc vào sức nặng của bé. **Nếu không biết sức nặng của bé, hãy cân bé trước khi cho uống lượng thuốc đầu tiên.** Biểu đồ cho biết bao nhiêu thuốc đủ một liều cho bé. Bạn nên cho bé một liều mỗi ngày từ 3 đến 6 tuần lễ.

Nếu bé cân (lbs)	cho bé.
ít hơn 10 lbs	Một nửa (1/2) muỗng trà (2.5ml) của Rifampin hồn hợp
10 – 17 lbs	Một (1) muỗng trà (5ml) của Rifampin hồn hợp
18 – 30 lbs	Hai (2) muỗng trà (10ml) của Rifampin hồn hợp
31 – 44 lbs	Ba (3) muỗng trà (15ml) của Rifampin hồn hợp
45 – 55 lbs	Bốn (4) muỗng trà (20ml) của Rifampin hồn hợp
56 – 70 lbs	Năm (5) muỗng trà (25ml) của Rifampin hồn hợp
71 – 88 lbs	Sáu (6) muỗng trà (30ml) của Rifampin hồn hợp

Trẻ em nặng hơn 88 lbs để bị nguy về sốt brucellosis nên uống hai (2) viên nhộng rifampin 300-mg một lần trong ngày (cùng giờ mỗi ngày nếu có thể) từ 3 đến 6 tuần lễ. Nếu bé không nuốt được viên nhộng, dùng các điều hướng dẫn để pha chế hồn hợp và cho uống sáu (6) muỗng trà một lần trong ngày.

### Cách nên giữ hồn hợp rifampin được pha chế sẵn

- Pha chế hồn hợp rifampin mỗi ngày; bỏ đi tất cả những phần không dùng.
- Rifampin trộn lẫn với bất cứ thức phẩm để nghi sẽ được giữ từ nhất 24 giờ trong tủ lạnh.

**GHI CHÚ:** Trẻ em 8 tuổi hay lớn hơn cũng nên nhận thêm Doxycycline. Trẻ em ít hơn 8 tuổi cũng nên nhận thêm C0-Trimoxazole. Vui lòng xem các phụ bản về hướng dẫn và liều lượng.