

Thẻ này giải thích cách pha chế lượng thuốc của  
**CIPROFLOXACIN**  
cho các bé nhỏ và trẻ em bị nguy hiểm về **tularemia/sốt thỏ/bệnh thỏ**

Khi bạn được thông báo bởi liên bang, tiểu bang, hay chính quyền địa phương rằng bạn đã bị nguy hiểm về sốt thỏ, điều cần thiết là pha chế **khẩn cấp** lượng thuốc của ciprofloxacin cho các bé thỏ và trẻ em, dùng các viên ciprofloxacin

### Bạn sẽ cần:

- Một (1) viên ciprofloxacin 500-milligram (mg)
- Muỗng trà kim loại
- Muỗng phân lượng (1 muỗng trà; và ½ muỗng trà)  
(GHI CHÚ muỗng lường thuốc được cung cấp, tuy nhiên nếu không sẵn có, hãy dùng muỗng kim loại để nghiền, đo lường và cho uống thuốc)
- 1 chén nhỏ
- Một trong những thực phẩm này
  - Nước ngọt sôcôla
  - Nước ngọt maple/cây thích
  - Nước ngọt của caramel/đường trắng
  - Ketchup/sốt cà chua

### Hướng dẫn:

1. Để một (1) viên ciprofloxacin 500-mg vào một cái chén nhỏ. Nghiền nát viên thuốc bằng phía lưng của muỗng kim loại cho đến khi không còn thấy những mảnh thuốc lớn.



2. Thêm sáu (6) muỗng trà của thực phẩm vào ciprofloxacin nghiền nát. Khuấy đều cho đến khi thuốc hòa tan với thực phẩm.



## Bao nhiêu Ciprofloxacin Hồn hợp Cho Đứa trẻ

Số muỗng trà của ciprofloxacin hồn hợp cho một đứa trẻ tùy thuộc vào sức nặng của đứa trẻ. *Nếu không biết sức nặng của đứa trẻ, hãy cân đứa trẻ trước khi cho uống lượng thuốc đầu tiên* Biểu đồ định bao nhiêu đủ trong một lượng thuốc cho đứa bé. Bạn nên cho bé **hai lượng thuốc mỗi ngày** (một vào buổi sáng và một vào buổi tối) **đến 14 ngày**.

<b>Nếu bé cân</b>	<b>Cho bé</b>
4 – 6.5 cân (lbs)	Một nửa (1/2) muỗng trà (2.5ml) của Ciprofloxacin hồn hợp
7 – 12.5 (lbs)	<b>Một (1) muỗng trà (5ml) của Ciprofloxacin hồn hợp</b>
13 – 18 (lbs)	Một và một nửa (1 ½) muỗng trà (7.5ml) của Ciprofloxacin hồn hợp
19 – 24 (lbs)	<b>Hai (2) muỗng trà (10ml) của Ciprofloxacin hồn hợp</b>
25 – 30 (lbs)	Hai và một nửa (2 ½) muỗng trà (12.5ml) Ciprofloxacin hồn hợp
31 – 37 (lbs)	<b>Ba (3) muỗng trà (15ml) của Ciprofloxacin hồn hợp</b>
38 – 43 (lbs)	Ba và một nửa (3 ½) muỗng trà (17.5ml) của Ciprofloxacin hồn hợp
44 – 49 (lbs)	<b>Bốn (4) muỗng trà (20ml) của Ciprofloxacin hồn hợp</b>
50 – 55 (lbs)	Bốn và một nửa (4 ½) muỗng trà (22.5ml) của Ciprofloxacin hồn hợp
56 – 61 (lbs)	<b>Năm (5) muỗng trà (25ml) của Ciprofloxacin hồn hợp</b>
62 – 67 (lbs)	Năm và một nửa (5 ½) muỗng trà (27.5ml) của Ciprofloxacin hồn hợp
68 – 73 (lbs)	<b>Sáu (6) muỗng trà (30ml) của Ciprofloxacin hồn hợp (hay 1 viên)</b>

Trẻ em nặng hơn 73 cân bị nguy hiểm về tularemia nên uống một (1) viên 500-mg ciprofloxacin hai lần một ngày (cùng giờ mỗi ngày nếu có thể) **đến 14 ngày**. Nếu đứa bé không nuốt trọn những viên thuốc, hay dùng cách hướng dẫn pha chế một hồn hợp và cho uống 6 muỗng trà hai lần một ngày.

### Cách nên giữ hồn hợp ciprofloxacin pha chế sẵn

- Pha chế hồn hợp ciprofloxacin mỗi ngày; giữ hồn hợp trong vật chứa đầy bọc kín trong tủ lạnh. Hồn hợp sẽ được giữ ít nhất 24 giờ trong tủ lạnh.
- Bỏ đi các phần không dùng.