

Thẻ này giải thích cách pha chế khẩn cấp của
DOXYCYCLINE
cho bé thơ và trẻ em bị nguy hiểm về anthrax/bệnh than


Khi bạn đã được thông báo bởi liên bang, tiểu bang, hay chính quyền địa phương rằng bạn đã bị nguy hiểm về anthrax, điều cần thiết là pha chế khẩn cấp lượng thuốc từ các viên của doxycycline cho bé thơ và trẻ em.

Bạn sẽ cần:

- Một (1) viên doxycycline 100 milligram (mg)
- Muỗng kim loại
- Muỗng phân lượng (1 muỗng trà; và ½ muỗng trà)
(GHI CHÚ muỗng lường thuốc được cấp, tuy nhiên nếu không sẵn có, hãy dùng muỗng kim loại để nghiền, đo lường và cho muỗng thuốc)
- 1 chén nhỏ
- Một trong những thực phẩm này
 - nước ngọt socola
 - nước ngọt maple/cây thích
 - nước ngọt đường trắng/caramel
 - sốt trái táo

Hướng dẫn:

1. Để một viên thuốc doxycycline 100-mg vào chén nhỏ. Nghiền viên thuốc bằng phía lưng của muỗng kim loại cho đến khi không còn thấy những mảnh lớn,



2, Thêm bốn (4) muỗng trà của thực phẩm vào doxycycline được nghiền. Khuấy đều cho đến khi thuốc nhũ hóa tan với thực phẩm.



Bao nhiêu Doxycycline Hồn hợp Cho một Đứa bé

Số muỗng trà của doxycycline hồn hợp cho một đứa bé tùy thuộc vào sức nặng của bé. *Nếu cân lượng của bé không được biết, hãy cân bé trước khi cho uống lượng thuốc đầu tiên.* Biểu đồ định bao nhiêu trong một lượng thuốc cho bé. Bạn nên cho bé *hai lượng thuốc* mỗi ngày (một vào buổi sáng và một vào buổi chiều) **đến 60 ngày**

Nếu bé cân	Cho bé
4 – 11 cân (lbs)	một nửa (1/2) muỗng trà (2.5ml) của Doxycycline hồn hợp
12 – 22 (lbs)	một (1) muỗng trà (5ml) của Doxycycline hồn hợp
23 – 33 (lbs)	một và một nửa (1 ½) muỗng trà (7.5ml) của Doxycycline hồn hợp
34 – 45 (lbs)	hai (2) muỗng trà (10ml) của Doxycycline hồn hợp
46 – 55 (lbs)	hai và một nửa (2 ½) muỗng trà (12.5ml) của Doxycycline hồn hợp
56 – 65 (lbs)	ba (3) muỗng trà (15ml) của Doxycycline hồn hợp
66 – 77 (lbs)	ba và một nửa (3 ½) muỗng trà (17.5ml) của Doxycycline hồn hợp
78 – 88 (lbs)	bốn (4) muỗng trà (20ml) của Doxycycline hồn hợp (hay 1 viên)

Các em nang hơn 88 cân bị nguy hiểm về anthrax nên uống một (1) viên doxycycline 100-mg hai lần một ngày (cùng giờ mỗi ngày nếu có thể) **đến 60 ngày**. Nếu em không thể nuốt trong những viên thuốc, dùng cách hướng dẫn pha chế hồn hợp và cho uống 4 muỗng trà hai lần một ngày.

Cách nên giữ hồn hợp Doxycycline được pha chế

- Pha chế doxycycline hồn hợp mỗi ngày; giữ hồn hợp trong vật chứa đậy kín trong tủ lạnh.
- Doxycycline được hòa hợp với bất cứ thực phẩm nào được đề nghị sẽ giữ lâu ít nhất 24 giờ.
- Bỏ tất cả các phần không sử dụng.