

Thẻ này giải thích cách pha chế khẩn cấp lượng thuốc của

DOXYCYCLINE

cho bé thỏ và trẻ em bị nguy hiểm về anthrax/bệnh than


Một khi bạn đã được thông báo bởi liên bang, tiểu bang, hay chính quyền địa phương rằng bạn đã bị nguy hiểm về anthrax, điều cần thiết là pha chế **khẩn cấp** các lượng thuốc của doxycycline cho các bé thỏ và trẻ em, sử dụng các viên doxycycline

Bạn sẽ cần:

- Một (1) viên doxycycline 100 milligram (mg)
- Muỗng trà kim loại
- Muỗng đo lường (1 muỗng trà; và ½ muỗng trà)
(LỐI GHI CHÚ muỗng đo lường được cấp; tuy nhiên nếu không có sẵn; dùng muỗng kim loại để nghiền, đo lường và cho uống thuốc)
- 1 chén nhỏ
- Một của những thực phẩm này
 - Nước ngọt sôcôla
 - Nước ngọt maple/cây thích
 - Nước ngọt caramel/đường trắng
 - Sốt trái táo

Hướng dẫn:

1. Đặt một (1) viên doxycycline 100-mg vào chén nhỏ. Nghiền viên thuốc bằng phần lưng của muỗng kim loại cho đến khi không còn thấy những mảnh lớn.



2. Thêm bốn (4) muỗng trà bằng phẳng của thực phẩm vào doxycycline nghiền nát. Khuấy trộn đều với thực phẩm.



Bao nhiêu Doxycycline Hồn hợp để Cho một Em bé

Số muỗng trà của doxycycline hồn hợp để cho một em bé tùy theo sức nặng của bé. *Nếu sức nặng của bé không được biết, hãy cân bé trước khi cho uống lượng thuốc đầu tiên.* Biểu đồ định bao nhiêu đủ một lượng thuốc cho em bé. Bạn nên cho bé *hai lượng thuốc* mỗi ngày (một vào buổi sáng và một vào buổi chiều) **đến 10 ngày.**

Neu be cân (lbs)	Cho bé
4 – 11 (lbs)	một nửa (1/2) muỗng trà (2.5ml) của Doxycycline hồn hợp
12 – 22 (lbs)	một (1) muỗng trà (5ml) của Doxycycline hồn hợp
23 – 33 (lbs)	một và một nửa (1 ½) muỗng trà (7.5ml) của Doxycycline hồn hợp
34 – 45 (lbs)	hai (2) muỗng trà (10ml) của Doxycycline hồn hợp
46 – 55 (lbs)	hai và một nửa (2 ½) muỗng trà (12.5ml) của Doxycycline hồn hợp
56 – 65 (lbs)	ba (3) muỗng trà (15ml) của Doxycycline hồn hợp
66 – 77 (lbs)	ba và một nửa (3 ½) muỗng trà (17.5ml) của Doxycycline hồn hợp
78 – 88 (lbs)	bốn (4) muỗng trà (20ml) của Doxycycline hồn hợp (hay 1 viên)

Trẻ em nặng hơn 88 cân bị nguy hiểm về anthrax nên uống một (1) viên doxycycline 100-mg hai lần một ngày (cùng giờ mỗi ngày nếu có thể) **đến 10 ngày.** Nếu bé không thể nuốt trọn những viên thuốc, hay dùng cách hướng dẫn để pha chế một hồn hợp và cho uống 4 muỗng trà mỗi ngày.

Cách nên giữ hồn hợp doxycycline đã được pha chế:

- Pha chế hồn hợp doxycycline mỗi ngày; giữ hồn hợp trong vật chứa được đậy kín trong tủ lạnh.
- Doxycycline trộn lẫn với bất cứ các thực phẩm được đề nghị sẽ được giữ ít nhất 24 giờ.
- Bỏ đi những phần không sử dụng.